

Pyrgus sidae (Esper, 1782)

VU

Categoría UICN:	Vulnerable
Criterio UICN:	D2
Nombre Vulgar:	Ajedrezada de bandas amarillas
Tipo:	Arthropoda
Clase:	Insecta
Orden:	Lepidoptera
Familia:	Hesperiidae

Área de distribución

Tiene una amplia distribución, que abarca desde el sureste de Francia, e Italia, por el sur de Europa, los Balcanes y los Urales llegando hasta Asia Menor e Irán. En España sólo se ha encontrado en cuatro cuadrículas de 100 km² en las provincias de Cáceres, Salamanca y Ávila.

Hábitat y Biología

En praderas y pastizales de montaña del piso del roble, entre los 800 y los 1.300 m de altitud. Planta nutricia larvaria *Potentilla recta*. Univoltina, inverna como oruga.

Factores de amenaza

El principal factor de amenaza es la singular distribución geográfica de la especie. Las poblacio-

nes ibéricas están aisladas y bastante alejadas de las poblaciones europeas de la especie. Además las propias poblaciones ibéricas están relativamente aisladas entre sí.

Medidas de conservación

La primera medida sería establecer con la mayor fiabilidad posible el estatus taxonómico de esta especie. Posteriormente habría que estudiar su distribución de una forma detallada.

Bibliografía

- Blázquez Caselles, A., Nieto Manzano, M.A. y Hernández Roldán, J.L. 2003. *Mariposas Diurnas de la provincia de Cáceres*. Junta de Extremadura, Cáceres. 211 pp.
- García-Barros, E., Munguira, M.L., Martín-Cano, J., Romo Benito, H., García-Pereira, P. y Maravalhas, E.S. 2004. *Atlas de las mariposas diurnas de la Península Ibérica e Islas Baleares (Lepidoptera: Papilionoidea y Hesperioidea)*. Monografías S.E.A., Vol. 11, Zaragoza. 227 pp
- Tolman, T. y Lewington, R. 1997. *Collins field guide butterflies of Britain and Europe*. HarperCollins Publishers. London, 320 pp.

*Autores: J. Martín, M.L. Munguira
y E. García-Barros*

