

MACI: Inventario Clínico para Adolescentes de Millon

Corrección y resultados (**Descatalogado. No es posible la corrección automatizada**)

Informe del test: [Perfil gráfico](#)

Autor: Theodore Millon, con la colaboración de Carrie Millon y Roger Davis.

Editor: TEA

Finalidad: Evaluación de las características de la personalidad y los síndromes clínicos de los adolescentes

Variables:

PROTOTIPOS DE PERSONALIDAD:

- Introvertido (1)
- Inhibido (2A)
- Pesimista (2B)
- Sumiso (3)
- Histriónico (4)
- Egocéntrico (5)
- Rebelde (6A)
- Rudo (6B)
- Conformista (7)
- Oposicionista (8A)
- Autopunitivo (8B)
- Tendencia límite (9)

PREOCUPACIONES EXPRESADAS:

- Difusión de la identidad (A)
- Desvalorización de sí mismo (B)
- Desagrado por el propio cuerpo (C)
- Incomodidad respecto al sexo (D)
- Inseguridad con los iguales (E)
- Insensibilidad social (F)
- Discordancia familiar (G)
- Abusos en la infancia (H)

SÍNDROMES CLÍNICOS:

- Trastornos de la alimentación (AA)
- Inclinación al abuso de sustancias (BB)
- Predisposición a la delincuencia (CC)
- Propensión a la impulsividad (DD)
- Sentimientos de ansiedad (EE)
- Afecto depresivo (FF)
- Tendencia al suicidio (GG)

Descripción: El MACI ha sido diseñado para evaluar características de personalidad y síndromes clínicos en adolescentes. Su específico diseño para adolescentes, contrasta con otros cuestionarios clínicos pensados para población adulta.

El completo sistema teórico que lo sustenta y la confluencia en sugerencias diagnósticas y elementos con el actual DSM IV, así como un completo estudio de validación, lo hacen un valioso y relevante instrumento. Es especialmente útil en la evaluación y confirmación de hipótesis diagnósticas, en la planificación del tratamiento y en la medida del progreso en las diferentes fases del tratamiento.

Consta de 160 elementos que se agrupan en 27 escalas divididas en tres grandes áreas: Características de Personalidad, Preocupaciones Expresadas y Síndromes Clínicos. Dispone de puntos de corte para tomar decisiones ante trastornos o síndromes clínicos y de índices de validez y control.

Administración: Normalmente Individual, en ciertas ocasiones puede hacerse una aplicación colectiva

Niveles de aplicación: de 13 a 19 años

Duración: Variable, aprox. 30 minutos.

Baremación: Baremos de población clínica diferenciados por sexo y edad en puntuaciones tasa base (TB)