

MCMIII:

Inventario Clínico Multiaxial de Millon - III

Corrección y resultados

Informe del test: Perfil gráfico

Autor: T. Millon, R. Davis y C. Millon

Editor: Pearson Education

Finalidad: Suministrar información al profesional clínico en tareas de evaluación y toma de decisiones de tratamiento sobre personas con dificultades emocionales e interpersonales. Evaluación de cuatro escalas de control, 11 escalas básicas, 3 rasgos patológicos, 7 síndromes de gravedad moderada y 3 síndromes de gravedad severa.

Escalas:

PATRONES CLÍNICOS DE PERSONALIDAD:

- Escala 1: Esquizoide
- Escala 2: Fóbica (evitativa)
- Escala 2B: Depresivo
- Escala 3: Dependiente (sumisa)
- Escala 4: Histriónica
- Escala 5: Narcisista
- Escala 6A: Antisocial
- Escala 6B: Agresivo-Sádica
- Escala 7: Compulsiva (rígida)
- Escala 8A: Pasivo-Agresiva
- Escala 8B: Autodestructiva (masoquista)

SÍNDROMES CLÍNICOS:

- Escala A: Trastorno de ansiedad
- Escala H: Trastorno somatomorfo
- Escala N: Trastorno bipolar
- Escala D: Trastorno distímico
- Escala B: Dependencia del alcohol
- Escala T: Dependencia de sustancias
- Escala R: Trastorno de estrés postraumático

PATOLOGÍA GRAVE DE PERSONALIDAD:

- Escala S: Esquizotípica
- Escala C: Límite (borderline)
- Escala P: Paranoide

SÍNDROMES GRAVES:

- Escala SS: Pensamiento psicótico
- Escala CC: Depresión mayor
- Escala PP: Trastorno delirante

ÍNDICES MODIFICADORES:

- Escala V: Validez
- Escala X: Sinceridad
- Escala Y: Deseabilidad
- Escala Z: Alteración

Descripción: El enfoque de Millon para la exploración e identificación de dificultades emocionales y personales se ha convertido en un importante referente en el campo de la Psicopatología. El MCMI-III reúne los últimos avances teóricos, empíricos y profesionales para conformar un instrumento muy útil en la toma de decisiones con los trastornos comportamentales o síndromes clínicos. El inventario se apoya en un nuevo marco teórico: la teoría evolutiva. Con la finalidad de optimizar la correspondencia con el DSM IV se han sustituido 95 elementos y se han añadido dos nuevas escalas: un patrón de personalidad clínico (Depresivo) y un nuevo síndrome (Estrés postraumático).

Los psicólogos y psiquiatras deben usar el MCMI-III principalmente con los pacientes adultos que presenten dificultades de tipo social, emocional o interpersonal, pero también es aplicable para confirmar diagnósticos sobre salud mental y analizar e investigar la personalidad.

La adaptación española ha contado con más de 900 casos, lo que ha permitido realizar un estudio riguroso sobre las tasas de prevalencia de cada trastorno y síndrome en nuestra población, un análisis detallado sobre las bondades psicométricas del inventario y la construcción de baremos y puntos de corte representativos.

Administración: Individual y colectivo

Niveles de aplicación: Adultos

Duración: Variable, entre 20 y 30 minutos.

Baremación: Baremos en puntuaciones de prevalencia (PREV) a partir de una muestra clínica española.