

# MMPI-2 RF:

## Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 Reestructurado.

Corrección y resultados

Informe del test: Perfil gráfico

**Autor:** Yossef S. Ben-Porath y Auke Tellegen

**Editor:** TEA

**Finalidad:** Evaluación de varios factores o aspectos de la personalidad. Contiene 8 escalas de validez, 3 escalas de segundo orden (dimensiones globales), 9 escalas clínicas reestructuradas, 23 escalas de problemas específicos (5 escalas somáticas, 9 de internalización, 4 de externalización, 5 de relaciones interpersonales), 2 escalas de intereses y 5 escalas de personalidad psicopatológica (PSY-5).

**Escalas:**

### ESCALAS DE VALIDEZ:

1. Ausencia de respuesta al contenido:
  - Puntuación interrogante (?)
  - Inconsistencia de respuesta variables (VRIN-r)
  - Inconsistencia de respuestas verdadero (TRIN-r)
2. Exageración de síntomas:
  - Infrecuencia (F-r)
  - Psicopatología infrecuente (Fp-r)
  - Quejas somáticas infrecuentes (Fs)
  - Validez de los síntomas (FBS-r)
  - Sesgo de respuesta (RBS)
3. Minimización de síntomas:
  - Virtudes inusuales (L-r)
  - Validez del ajuste (K-r)

### ESCALAS DE SEGUNDO ORDEN (dimensiones globales):

- Alteraciones emocionales o internalizadas (EID)
- Alteraciones del pensamiento (THD)
- Alteraciones del comportamiento o externalizadas (BXD)

### ESCALAS CLÍNICAS REESTRUCTURADAS (RC):

- Desmoralización (RCd)
- Quejas somáticas (RC1)
- Escasez emociones positivas (RC2)
- Desconfianza (RC3)
- Conducta antisocial (RC4)
- Ideas persecutorias (RC6)
- Emociones negativas disfuncionales (RC7)
- Experiencias anormales (RC8)
- Activación hipomaniaca (RC9)

## ESCALAS DE INTERESES:

- Interés estético-literario
- Interés mecánico-físico

## ESCALAS DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS:

1. Escalas somáticas / cognitivas:
  - Malestar general (MLS)
  - Quejas gastrointestinales (GIC)
  - Quejas de dolor de cabeza (HPC)
  - Quejas neurológicas (NUC)
  - Quejas cognitivas (COG)
2. Escalas de internalización:
  - Ideación suicida (SUI)
  - Indefensión / Desesperanza (HLP)
  - Inseguridad (SFD)
  - Ineficacia (NFC)
  - Estrés / Preocupaciones (STW)
  - Ansiedad (AXY)
  - Propensión a la ira (ANP)
  - Miedos incapacitantes (BRF)
  - Miedos específicos (MSF)
3. Escalas de externalización:
  - Problemas de conducta juveniles (JCP)
  - Abuso de sustancias (SUB)
  - Agresión (AGG)
  - Activación (ACT)
4. Escalas interpersonales:
  - Problemas familiares (FML)
  - Pasividad interpersonal (IPP)
  - Evitación social (SAV)
  - Timidez (SHY)
  - Misantería (DSF)

## LAS CINCO ESCALAS DE PERSONALIDAD PSICOPATOLÓGICA (PSY-5):

- Agresividad-revisada (AGGR-r)
- Psicoticismo-revisada (PSYC-r)
- Falta de control-revisada (DISC-r)
- Emocionalidad negativa / Neuroticismo-revisada (NEGE-r)
- Introversión / Escasa emocionalidad positiva-revisada (INTR-r)

### Descripción:

Nueva versión del MMPI cuyas principales innovaciones son una reducción sustancial del número de ítems y del tiempo de aplicación y un nuevo conjunto de escalas que permiten una evaluación más eficiente, centrada en el contenido y coherente en su estructura y organización. Consta de 338 ítems que requieren un tiempo de aplicación de entre 35 y 50 minutos, sustancialmente menor que el MMPI-2, y ha sido fruto de un laborioso y complejo proceso de desarrollo y validación.



Contiene ocho escalas de validez que permiten detectar eficazmente las principales amenazas a la interpretación de un protocolo: ausencia de respuesta al contenido y exageración o minimización de síntomas.

Sus 42 escalas sustantivas permiten una evaluación eficiente y actualizada de las variables clínicamente relevantes en distintas áreas de la personalidad y la psicopatología.

Para cada escala se incluyen hipótesis interpretativas de síntomas clínicos, tendencias comportamentales y características de la personalidad asociadas, así como consideraciones de tipo diagnóstico y terapéutico a tener en cuenta.

<b>Administración:</b>	Individual o colectiva
<b>Niveles de aplicación:</b>	Solamente adultos (19-65 años). Existe una versión (MMPI-A) para adolescentes
<b>Duración:</b>	Variable de 35 a 50 minutos
<b>Baremación:</b>	Baremos en puntuaciones T a partir de una muestra normal de población española